CONDICIONES DEL SOL

Regiones activas	Número total de regiones activas 2: 12776 en S14E01 y la 12777 en S24W88, quedando sólo la 12776 a partir del día 21 en adelante.
Agujeros coronales	Cantidad de agujeros coronales 4 principales y luego algunos más pequeños; los principales en el norte, centro y sur del disco solar
Fulguraciones solares	Número total de fulguraciones solares (11); cantidad de fulguraciones clase B(11), C(0), M (0)y X(0); Máximo flare B3.6
Eyecciones de masa coronal	El día 23 a las 23.30 hs no dirigida hacia la Tierra proveniente de un filamento en el limbo noeste solar
Partículas energéticas	Condiciones calmas en protones.

CONDICIONES DEL MEDIO INTERPLANETARIO

Viento solar	Velocidad media 450 km/s en ascenso desde 330 km/s al comienzo del período en ascenso a partir de la tarde del día 23 cuando llegó el flujo de viento solar rápido proveniente de los agujeros coronales solares alcanzando un máximo de 581 km/s el día 25 manteniéndose en valores de viento solar rápido.
Componente sur del campo magnético interplanetario	Intensidad media alrededor de 0 nT, con valor máximo de -11 nT el día 23 a la tarde, luego valores menores de alrededor de -3 nT o cercanos a cero el resto del período
Estructuras interplanetarias	Eyección coronal de masa no dirigida hacia la Tierra

CONDICIONES DE MAGNETÓSFERA

Índice Kp	Máximo valor 4.7 nT el dia 23 a las 18 hs fluctuando entre 3 y uno durante el periodo, y creciendo nuevamente el dia 25 a 4 nT.

Índice DST	En general valores negativos del orden de las decenas con Máximo de -47 nT el día 24 a las 9 UT y luego recuperando a valores mayores.
Índice Ksa	Máximo valor de casi llegando a 5 nT dia 25 , el 24 y el 23 y valores menores oscilando alrededor de 3 nT el resto del periodo
Electrones de alta energía	Flujo de electrones de energía mayor a 2 Mev de alrededor de 3.350 partículas por centímetro cuadrado por segundo y estereoradian , superando el percentil 85% respecto de la media

CONDICIONES DE LA IONOSFERA

foF2	En Tucumán predominan valores por debajo de la curva media mensual, con diferencias de hasta 5 MHz. Y un pico por encima de la media alrededor de las 18 hs UT el día 25. En Bahía Blanca, se sigue por debajo de la media mensual aproximadamente durante todo el período con diferencias de hasta 5 Mhz.
TEC	Máximo valor 30 TECU todos los días del período en la zona noroeste a partir de horas de la tarde llegando a valores de 20 TECU desde el noroeste hasta la patagonia.

PRONÓSTICOS

Viento solar	Se prevé viento solar rápido en los próximos 3 días, con intensidades de alrededor de 500 km/s.
Fulguraciones solares	Baja probabilidad de fulguraciones clase C, M y X
Tormentas geomagnéticas	Probabilidad de tormenta geomagnética clase G1 de alrededor del 30% dentro de los próximos 3 dias
Tormentas de radiación solar	Baja probabilidad de ocurrencia de tormenta de radiación clase S1 o mayor
Bloqueos de radio	Baja probabilidad de ocurrencia de bloqueo de radio R1 o mayor