CONDICIONES DEL SOL

Regiones activas	13; El día 9 de junio se observa la región activa 14104(N06) que deja de observarse el día 10 de junio, la región activa 14106(N13) que deja de observarse el día 11 de junio, la región activa 14108(S22) que deja de observarse el día 14 de junio, y las regiones activas 14105(S15), 14107(S18) y 14109(S16) que se observan durante toda la semana. El día 10 de junio comienzan a observarse las regiones activas 14110(N05) y 14111(N14). El día 11 de junio comienza a observarse la región activa 14112(S09). El día 12 de junio comienzan a observarse las regiones activas 14113(N10) y 14114(N17). El día 13 de junio comienza a observarse la región activa 14115(N21). El día 12 de junio comienza a observarse la región activa 14116(S12).
Agujeros coronales	Se observó un solo agujero coronal levemente al sur del centro del disco solar el día 15 de junio con una extensión de aproximadamente el 15% de extensión.
Fulguraciones solares	91; #C(84), #M(7) y #X(0); M8.5 a las 18:07 UT del día 15 de junio.
Eyecciones de masa coronal	33; ocho el día 9 de junio, diez el día 10 de junio, ocho el día 11 de junio, cinco el día 12 de junio, seis el día 13 de junio, tres el día 14 de junio, y seis el día 15 de junio. Una tuvo impacto en la Tierra durante el día 13 de junio, aunque con un choque interplanetario no tan intenso.
Partículas energéticas	Sin eventos.

CONDICIONES DEL MEDIO INTERPLANETARIO

Viento solar	La velocidad del viento solar se mantuvo alrededor de 450 km/s durante toda la semana.
Componente sur del campo magnético interplanetario	Bz = -15 nT el día 14 de junio a las 02:00 UT. Durante toda la semana predominan valores de |Bz| < 10 nT.
Estructuras interplanetarias	Una ICME que impacta la Tierra el día 13 de juniio.

CONDICIONES DE LA MAGNETÓSFERA

Índice Kp	Kp = 6.33 a las 00-03 UT del día 13 de junio. Durante el resto de la semana predominan valores de Kp < 4. A excepción del día 13 en el que ocurre la tormenta geomagnética.
Índice DST	DST = -104 nT el día 13 de junio a las 21 UT. Predominan los valores negativos durante toda la semana.
Índice Ksa	Ksa = 6+ el día 12 de junio a las 09-12 UT, y a las 12-15 UT del día 13 de junio.
Electrones de alta energía	$1x10^3$ partículas cm^{-2} sr^{-1} s^{-1} el 9 de junio. Durante toda la semana predominan valores por debajo del percentil 75.
Fluencia de electrones	Fluencia de nivel baja durante toda la semana.

CONDICIONES DE LA IONOSFERA

foF2	En Bahía Blanca se observan valores similares a los de la curva media mensual durante todas las horas de todos los días de la semana. En Tucumán se observan valores similares a los de la curva media mensual durante todas las horas de todos los días de la semana.
TEC	Sin datos.

PRONÓSTICOS

Viento solar	Se espera que la velocidad del viento solar se mantenga alrededor de los 400 km/s.
Fulguraciones solares	Muy alta probabilidad de fulguraciones clase C, alta probabilidad de fulguraciones clase M, baja probabilidad de fulguraciones clase X.
Tormentas geomagnéticas	Sin probabilidad de tormenta clase G2 o mayor.
Tormentas de radiación solar	Alta probabilidad de ocurrencia de Tormenta de radiación clase S1.
Bloqueos de radio	Alta probabilidad de bloqueos de radio R1-R2.

Moderada probabilidad de bloqueos de radio R3 o mayor.